



Вакцинация от COVID-19 беременных и кормящих: вопросы и ответы

Можно ли прививаться беременным и кормящим?

В настоящее время беременность исключена из списка противопоказаний, получены убедительные доказательства в пользу вакцинации беременных. Вакцинация рекомендуется в том случае, когда польза прививки для матери превышает риск для развития плода.

Кормящие матери не подлежат вакцинации.

Можно ли прививаться в период планирования беременности?

Да, вакцинация рекомендована парам, планирующим беременность и программы ВРТ.

Кто принимает решение о необходимости прививки для беременной женщины?

Решение о необходимости вакцинации принимает врач акушер-гинеколог, который ведет беременность, и сама женщина.

Зачем прививка беременным?

Прививка минимизирует риск заражения и тяжелого течения заболевания. В первую очередь это касается женщин, не сделавших прививку до наступления беременности и находящихся в группе высокого риска тяжелого течения COVID-19. Например, беременные, у которых есть нарушения обмена веществ, сахарный диабет, артериальная гипертония или дыхательные нарушения.

На каком сроке беременности можно делать прививку?

Прививку рекомендуется делать после 22 недель беременности. Это тот срок, который безопасен для плода - уже сформированы все органы и системы.



Порядок информирования беременных женщин о проведении вакцинации против новой коронавирусной инфекцией (НКВИ COVID-19).

Беременная женщина встает на диспансерный учет в женскую консультацию.

Врач акушер-гинеколог определяет дату, время, место проведения комплекса пренатальной диагностики 1 триместра.

Во время проведения **комплекса пренатальной диагностики 1 триместра** в ГАУЗ СО «КДЦ «ОЗМР» либо КАОП, пациентке выдается на руки **листочка о проведении вакцинации** с предложением обдумать информацию, продумать интересующие вопросы по вакцинации.

Единственной вакциной, которая может быть использована для вакцинации беременных женщин является Гам-КОВИД-Вак.

По завершению КПД 1 триместра, врач акушер-гинеколог беременную женщину записывает на 2 скрининг.

Во время проведения **2 скрининга** в ГАУЗ СО «КДЦ «ОЗМР» либо КАОП, врач, завершающий исследование, должен задать пациентке **вопросы:**

- Знакомы ли Вы с правилами вакцинации?
- Какое решение по вакцинации Вы приняли?

В случае согласия беременной женщины, **врач осуществляет запись пациентки** на проведение вакцинации в сроке **гестации 22 недели.**

При выявлении **порока развития плода**, вакцинация **не предлагается.**

При **любых изменениях состояния** беременных женщин после вакцинации, звонить по **телефону:** (указать телефон горячей линии женской консультации)

Вакцинация от COVID-19 беременных и кормящих: вопросы и ответы



Можно ли прививаться беременным и кормящим?

В настоящее время беременность исключена из списка противопоказаний, получены убедительные доказательства в пользу вакцинации беременных. Вакцинация рекомендуется в том случае, когда польза прививки для матери превышает риск для развития плода.

Кормящие матери не подлежат вакцинации.

Можно ли прививаться в период планирования беременности?

Да, вакцинация рекомендована парам, планирующим беременность и программы ВРТ.

Кто принимает решение о необходимости прививки для беременной женщины?

Решение о необходимости вакцинации принимает врач акушер-гинеколог, который ведет беременность, и сама женщина.

Зачем прививка беременным?

Прививка минимизирует риск заражения и тяжелого течения заболевания.

В первую очередь это касается женщин, не сделавших прививку до наступления беременности и находящихся в группе высокого риска тяжелого течения COVID-19. Например, беременные, у которых есть нарушения обмена веществ, сахарный диабет, артериальная гипертония или дыхательные нарушения.

На каком сроке беременности можно делать прививку?

Прививку рекомендуется делать после 22 недель беременности. Это тот срок, который безопасен для плода - уже сформированы все органы и системы.